

Mögliche gastrointestinale Symptome der Zöliakie

- Chronische oder rezidivierende Durchfälle
- Chronische, therapieresistente Verstopfung
- Chronische Bauchschmerzen
- Bauchblähung
- Rezidivierende Übelkeit, häufiges Erbrechen
- Fettstuhl

Mögliche extraintestinale Symptome der Zöliakie


- Gewichtsverlust, Gedeihstörung, Wachstumsretardierung
- Verzögerte Pubertätsentwicklung, Ausbleiben der Menstruation
- Reizbarkeit, Müdigkeit, Deperssion
- Neuropathien
- Arthralgie/Arthritis
- Eisenmangelanämie
- Osteoporose
- aphthöse Stomatitis
- Dermatitis herpetiformis Duhring
- Zahnschmelzdefekte
- erhöhte Leberwerte
- Vitamine Mangel

Erhöhtes Zöliakierisiko

- Verwandte ersten Grades von Zöliakiebetroffenen
- Typ-1-Diabetes
- Autoimmun Schilddrüsenerkrankungen (Hashimoto-Thyreoiditis)
- Autoimmunhepatitis
- Down-Syndrom, Turner-Syndrom und Williams-Beuren-Syndrom
- Selektive IgA-Mangel

Legende

tTG: Tissue-Transglutaminase Antikörper
EMA: Endomysium Antikörper
dGP: Deamidiertes Gliadin-Peptid
EIA: Enzymimmunassay
IIFT: Indirekter Immunfluoreszenz
Marsh: Marsh-Klassifikation (0 bis 3)
 Histologische Beurteilung der Dünndarmschleimhaut



Literatur:

1. S2k-Leitlinie Zöliakie, www.dgvs.de/leitlinien/zoeliakie
2. Husby S et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease.
3. AMBOSS GmbH, www.amboss.com/de