

Eine vollständige Liste aller individuellen Gesundheitsleistungen liegt Ihrem Arzt vor.

Fragen Sie Ihren Arzt nach weiteren Broschüren und stellen Sie Ihr persönliches Gesundheitsvorsorgeprogramm zusammen.

Ihr Arzt kann Sie sinnvoll beraten und über die anfallenden Kosten informieren.

HELICOBACTER PYLORI

PATIENTENINFORMATIONEN



Medizinische Laboratorien DÜSSELDORF



ÜBERBLICK

Magenbeschwerden sind ein häufiges Gesundheitsproblem. Zu den wichtigsten Erkrankungen des Magens gehören die

- Magenschleimhautentzündung (Gastritis)
- das Magengeschwür
- das Magenkarzinom.

Bei der Entstehung dieser Erkrankungen spielt die Infektion mit dem Bakterium *Helicobacter pylori* eine Rolle. Die Übertragung von *H. pylori* erfolgt von Mensch zu Mensch. Das Bakterium kann trotz des stark säurehaltigen Magenmilieus überleben und die Magenschleimhaut dauerhaft besiedeln.

Viele Träger von *H. pylori* haben keine Beschwerden und entwickeln keine Infektion.

Bei 10 – 20 % kommt es allerdings zu einer Infektion mit chronischer Magenschleimhautentzündung.

Weitere Gründe für eine Testung:

- Vor einer geplanten Dauermedikation mit Aspirin oder Schmerzmittel (NSAR)
- Bei Eisenmangelanämie ungeklärter Ursache

SYMPTOME

- Übelkeit, Erbrechen
- Schmerzen – insbesondere nach dem Essen
- nächtliche, krampfartige Beschwerden im Oberbauch
- Völlegefühl
- Bei chronischer Gastritis oft nur wenig Beschwerden

DIAGNOSTIK


- Magenspiegelung mit Probenentnahme
- ¹³C-Harnstoff-Atemtest
- Direktnachweis aus Stuhl
- *H. pylori* Antikörperbestimmung aus dem
- Mikrobiologische Kultur (in der Regel nur z Resistenzbestimmung)

Mit Hilfe dieser Labortest kann mit hoher Sicherheit eine *Helicobacter* Infektion nachgewiesen werden. Ein positiver Antikörpertest kann auch auf eine frühere, nicht aktive Infektion hinweisen und sollte mit anderen Tests bestätigt werden.

Zur Therapiekontrolle nach erfolgter Behandlung ist der Atem- oder Stuhltest sinnvoll.

WAS IST ZU BEACHTEN?

- Die Einnahme von Protonenpumpenhemmern kann die Ergebnisse beeinflussen
- Nach einer Behandlung sollte eine Erfolgskontrolle frühestens nach 4 Wochen durchgeführt werden



- Für eine zuverlässige *H. pylori*-Diagnostik sollten in der Regel zwei positive Testergebnisse vorliegen

THERAPIE?

Die Behandlung von *H. pylori*-assoziierten Geschwüren erfolgt durch die Bekämpfung (Eradikation) des Erregers mit einer Kombination von verschiedenen Antibiotika.

Diese ist jedoch nicht bei jeder Infektion mit *H. pylori* angemessen und sinnvoll.

Kontakt

Medizinische Laboratorien Düsseldorf
Nordstraße 44
40477 Düsseldorf

0211/4978-0
info@labor-duesseldorf.de

Besuchen Sie uns im Internet:
www.labor-duesseldorf.de