


Mögliche gastrointestinale Symptome der Zöliakie
• Chronische oder rezidivierende Durchfälle • Chronische, therapieresistente Verstopfung • Chronische Bauchschmerzen • Bauchblähung • Rezidivierende Übelkeit, häufiges Erbrechen • Fettstuhl
Mögliche extraintestinale Symptome der Zöliakie
• Gewichtsverlust, Gedeihstörung, Wachstumsretardierung • Verzögerte Pubertätsentwicklung, Ausbleiben der Menstruation • Reizbarkeit, Müdigkeit, Deperssion • Neuropathien • Arthralgie/Arthritis • Eisenmangelanämie • Osteoporose • aphthöse Stomatitis • Dermatitis herpetiformis Duhring • Zahnschmelzdefekte • erhöhte Leberwerte • Vitamine Mangel
Erhöhtes Zöliakierisiko
• Verwandte ersten Grades von Zöliakiebetroffenen • Typ-1-Diabetes • Autoimmun Schilddrüsenerkrankungen (Hashimoto-Thyreoiditis) • Autoimmunhepatitis • Down-Syndrom, Turner-Syndrom und Williams-Beuren-Syndrom • Selektive IgA-Mangel
Legende
tTG: Tissue-Transglutaminase Antikörper EMA: Endomysium Antikörper dGP: Deamidiertes Gliadin-Peptid EIA: Enzymimmunassay IIFT: Indirekter Immunfluoreszenz Marsh: Marsh-Klassifikation (0 bis 3) Histologische Beurteilung der Dünndarmschleimhaut



Literatur:

1. S2k-Leitlinie Zöliakie, www.dgvs.de/leitlinien/zoeliakie
2. Husby S et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease.
3. AMBOSS GmbH, www.amboss.com/de